

Estadística en Física Experimental (Verano 2019)

Guía de Problemas N° 2 | Variables aleatorias discretas – Hipergeométrica, Binomial, Binomial Negativa, Poisson, etc.

1. Se lanzan diez dados. ¿Cuál es la probabilidad de obtener exactamente tres seis?
2. En una caja de resistencias hay 20 defectuosas y 80 buenas. Tomamos 10 al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que la mitad sean buenas?
3. Unos amigos juegan con un par de dados. Los tiran n veces y gana quien acierte cuantas veces van a sumar 7. ¿Cuántas veces deberían tirar los dados para que lo más probable fuera ganar jugándole a que sale 10 veces?
4. Se lanza repetidamente una moneda cargada hasta que el primer resultado vuelve a aparecer. Muestre que:
 - (a) La probabilidad de que el juego termine en el lanzamiento $n + 2$ es $P_n = p^2q^n + q^2p^n$, donde p es la probabilidad de que salga cara y $q = 1 - p$.
 - (b) P_n satisface las tres propiedades de una probabilidad.
 - (c) La probabilidad de que el juego dure más de $n + 2$ lanzamientos es $qp^{n+1} + pq^{n+1}$.
 - (d) Si $p = 0$ o $p = 1$ habrá sólo dos tiradas, y en otro caso el número esperado de tiradas es siempre 3. ¿El resultado en este último caso depende del valor de p ?
 - (e) Muestre que si bien la duración promedio del juego es siempre 3 tiradas (para todo valor de p , salvo $p=0$ o $p=1$), una moneda pareja ($p=0.5$) maximiza la probabilidad que el juego dure más de 4 tiradas.
5. Un jugador participa en el juego del ejercicio anterior apostando plata. La regla es la siguiente:
 - (a) si el primer resultado es ceca (S), gana \$1 por cada cara (C) que salga hasta volver a obtener ceca. Si el primer resultado es cara, gana \$1 por cada ceca subsiguiente (por ejemplo, con CSSSSC gana \$4, con CC no gana nada). ¿Cuánta plata espera cobrar el jugador por participar?
 - (b) si ahora el juego paga \$1 por cada cara intermedia y \$2 por cada ceca intermedia ¿Cuánta plata espera ganar el jugador?
 - (c) el juego paga \$1 por la cantidad de caras totales que salieron ¿Cuánto espera ganar en este caso?(Sugerencia: le conviene calcular $E(X)$, siendo X la variable aleatoria monto ganado)
6. Al lanzarse un par de dados se espera que en promedio salga un doble seis cada 36 tiradas. Si se hacen sólo 25 tiradas, ¿conviene apostar a favor o en contra de la aparición de al menos un doble seis?
7. Para determinar si un autoproclamado adivino es un trucho se lo somete a un test que consiste en disponer boca abajo sobre la mesa diez cartas de truco, 5 oros y 5 bastos, y pedirle que adivine cuáles son los cinco bastos. Encuentre la probabilidad de que acierte tres o más bastos por pura casualidad.
8. El 1% de una población tiene planeado votar un cierto candidato **A**. Se realiza una encuesta tomando $n = 500$ habitantes al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que el resultado de intención de voto para **A** sea mayor o igual que el 2%? Dicho de otra manera, ¿cuál es la probabilidad de que la encuesta se equivoque por más del 100%?
 - (a) Si el número de habitantes de la población es muchísimo mayor que n .
 - (b) Si hay $N = 5000$ habitantes en la población.
 - (c) ¿Cuántos habitantes N debería haber en la población para que los resultados entre (a) y (b) tuvieran una diferencia menor al 0.1%?

9. Una fábrica produce integrados, de los cuales el 20% son defectuosos y los comercializa en cajas de 10. Un comprador quiere rechazar las cajas que contengan más de 2 chips defectuosos, es decir, más que la especificación del fabricante. Para ganar tiempo, en vez de probar todos los chips decide implementar el siguiente test. De cada caja toma 6 chips al azar: (i) si ninguno es malo, acepta la caja; (ii) si uno solo es malo, revisa el resto de la caja; (iii) si 2 o más son malos, devuelve la caja al fabricante.
- ¿Qué fracción de las cajas tendrán más de 2 chips defectuosos?
 - ¿En qué fracción de las cajas deberá probar los 10 integrados?
 - ¿Cuál es la probabilidad de que haya 3 chips malos en una caja aceptada?
10. En promedio Messi mete un gol el 18.2% de las veces que pateo al arco.
- ¿Cuántas veces por partido debería patear para que la probabilidad de hacer al menos 2 goles sea mayor que el 90%?(Sugerencia: exploré numéricamente la solución de la ecuación trascendente)
 - ¿Cuál es el número esperado de goles que haría si pateo la cantidad de veces del ítem anterior?
 - Si el técnico decide que va a sacarlo justo después de hacer el segundo gol, ¿cuál es el número esperado de veces que pateó?
11. Una fuente radiactiva tiene una actividad de 4 Bq (Becquerel = 1 decaimiento s^{-1}). Calcule la probabilidad de observar al menos un decaimiento en (a) 1 segundo, (b) 2 segundos.
12. Para determinar la concentración de glóbulos blancos en sangre se procede así: i. se toma una muestra de 1 mm³ de sangre del paciente, ii. se diluye 10 veces para hacerla traslúcida, y iii. se cuentan los glóbulos contenidos en 1 mm³ de solución diluída. Si se encuentra que la concentración un paciente es 4.05 glob (nl)⁻¹, ¿cuál es el error estadístico porcentual de la medición?
13. Un experimento detecta en promedio dos neutrinos por día que son una señal de *fondo**.
- El día en que telescopios en la superficie observaron la explosión de una supernova, el detector observó 8 neutrinos. ¿Cuál es la probabilidad de que se detecten 8 o más neutrinos debido a una fluctuación del fondo? Se puede publicar entonces que hay evidencia experimental de que las supernovas emiten neutrinos?
 - Consideremos ahora que no hubo observación óptica, que se tomaron datos durante todo 1987, y que cierto día se observan 8 señales de neutrinos. ¿Cuál es la probabilidad de observar 8 o más neutrinos en al menos un día del año? Se puede concluir que por algún fenómeno cosmológico ese día aumentó el flujo de neutrinos sobre la Tierra? Analice conceptualmente la diferencia entre este caso y el anterior.
- Nota histórica: el detector gigante Irvine-Michigan-Brookhaven (IMB) que opera en una mina subterránea abandonada fue originalmente diseñado para medir el decaimiento del protón. El 23 de Febrero de 1987 el IMB detectó 8 neutrinos compatibles en tiempo con la explosión de la supernova SN 1987A ubicada a 168000 años luz de la Tierra. IMB jamás detectó el decaimiento de ningún protón.
14. Una fuente de luz emite en promedio 100 fotones s^{-1} . Durante cuánto tiempo deberá contarse fotones si se desea conocer la intensidad del haz con una precisión de 1/1000. Nota: use como ‘precisión’ el cociente $\sqrt{\text{varianza}}/\text{media}$.
15. Un astrónomo quiere mejorar una antigua determinación del período de un pulsar $\tau \pm \sigma_\tau/\sqrt{n}$, hecha a partir de $n = 25$ mediciones exitosas. Se sabe que por fluctuaciones en la polución de la atmósfera el 20% de las pulsaciones no serán correctamente observadas. Si el astrónomo quiere que la nueva determinación de τ sea el doble de precisa que la anterior,
- ¿cuántas observaciones exitosas (no afectadas por la atmósfera) son necesarias?
 - ¿cuál es la probabilidad de que necesite realizar 130 o más observaciones en total (tanto exitosas como afectadas) para alcanzar el grado de precisión deseada?
 - ¿cuántas observaciones totales debería planificar si quiere que la probabilidad de obtener la precisión deseada (o una incluso mejor) sea mayor al 99%?

*Se entiende por fondo a los eventos medidos que no provienen del proceso físico que se quiere estudiar. Por ejemplo eventos provenientes de decaimientos radiactivos en las cercanías del detector.

16. En cada uno de los siguientes casos, escriba la expresión (no se pide la cuenta!) que habría que mostrar para confirmar la afirmación hecha en *itálica*. Analice el ejemplo que ilustra cada caso.

(a) *Suma de poissonianas es poissoniana*. Una fuente radiactiva emite λ partículas por unidad de tiempo. Si se ubica dicha fuente frente a un detector en presencia de un fondo radiactivo de μ emisiones por unidad de tiempo, el detector contará indistintamente las partículas del fondo y de la fuente. Si el número de partículas emitidas en un tiempo t por la fuente (i) y el fondo (j) tienen distribuciones poissonianas $P_i(\lambda t)$ y $P_j(\mu t)$ respectivamente, entonces: el número total de cuentas en el detector tiene distribución poissoniana con constante $(\lambda + \mu)t$.

(b) *Composición de poissoniana con una binomial es poissoniana*. Un detector tiene una eficiencia $\epsilon \leq 1$ para registrar partículas. Si le llegan n partículas, la probabilidad de detectar k será entonces la binomial $B_k(n, \epsilon)$. Si se coloca frente a él una fuente radiactiva que en promedio emite λ partículas en un tiempo t , entonces: el número de registros r obtenidos por el detector en un tiempo t , tiene una distribución poissoniana con constante $\epsilon\lambda t$.

Nota: este problema describe la práctica de nuclear de Laboratorio 5, donde se obtiene un gráfico de Poisson midiendo una fuente radiactiva (poissoniana) con un detector que no tiene eficiencia 100% (binomial).

(c) *Composición de binomial con hipergeométrica es binomial*. Una población tiene dos clases de elementos, los del tipo 'a' con probabilidad p y los del tipo 'b' con probabilidad $(1 - p)$. Se selecciona una primera muestra de N_1 elementos. Luego se selecciona una submuestra de $N_2 (\leq N_1)$ elementos tomados al azar de la primera muestra. Es claro que la probabilidad de encontrar k_1 elementos de la clase 'a' en la primera muestra es una binomial $B(k_1; N_1, p)$. Bajo estas condiciones: la probabilidad de encontrar k elementos del tipo 'a' en la submuestra (de tamaño N_2) también es una binomial dada por $B(k; N_2, p)$. Es decir, que en estas condiciones tomar una muestra al azar a partir de otra muestra al azar es equivalente a haber tomado directamente una única muestra de tamaño N_2 .

.....
Fórmulas útiles

Distribución	Fórmula	Esperanza	Varianza
Binomial	$B(X = k n, p) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$	np	$np(1 - p)$
Poisson	$P(X = k \lambda) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$	λ	λ
Hipergeométrica	$H(X = k N, n, K) = \frac{\binom{K}{k} \binom{N-K}{n-k}}{\binom{N}{n}}$	$\frac{nK}{N}$	$n \frac{K(N-K)}{N^2} \left(\frac{N-n}{N-1} \right)$
Binomial negativa	$P(X = n k, p) = \binom{n-1}{k-1} p^k (1-p)^{n-k}$	$\frac{k}{p}$	$\frac{k(1-p)}{p^2}$

La suma parcial $\sum_{n=0}^N p^n = \frac{p^{N+1} - 1}{p - 1}$, converge a una serie geométrica converge si $p < 1$ (y diverge en otro caso)

$$\sum_{n=0}^{\infty} p^n = \frac{1}{1 - p}$$

La serie aritmético geométrica vale: $\sum_{n=0}^{\infty} (an + b) r^n = \frac{b}{1 - r} + \frac{ar}{(1 - r)^2}$.

La serie

$$\sum_{n=0}^{\infty} (an + b) p^n = \frac{b}{1 - p} + \frac{ap}{(1 - p)^2}$$

converge si $p < 1$ (y diverge en otro caso).