

Estadística en Física Experimental (Verano de 2019)

Guía de Problemas N° 6 | Estimación puntual de parámetros

Consistencia y Sesgo

1. Considere el estadístico $S^2 = \sum_i^n (x_i - \mu)^2 / n$, donde los x_i son variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas y la esperanza $E(x_i) = \mu$ es conocida.
 - (a) ¿Puede S^2 ser considerado un *estadístico* dado que no solo es función de las observaciones sino también de los parámetros μ y n ?
 - (b) Mostrar que es un estimador no sesgado de la varianza de X .
 - (c) Encuentre el error de S^2 cuando los x_i son gaussianos.
 - (d) ¿Cuánto vale la varianza de S^2 al usar la fórmula de propagación de errores? ¿Porqué falla? [Rta: "Var(S^2)"=0]
2. Muestre que $s^2 = \sum_i^n (x_i - \bar{x})^2 / n$ es un estimador sesgado de $\text{Var}(X)$, cuyo bias vale $-\sigma^2/n$, mientras que $\tilde{s}^2 = \sum_i^n (x_i - \bar{x})^2 / (n-1)$ es no sesgado.
3. En general, que t sea un estimador no sesgado de θ , no implica que t^2 sea no sesgado para θ^2 .
 - (a) Convéznase intuitivamente que ésto es cierto, sin hacer cuentas, para el caso que $\theta = E(x)$ y $t = \bar{x}$, con $f_X(x)$ simétrica alrededor de $x = 0$.
 - (b) Sea k una variable aleatoria con distribución binomial $B_k(n, p)$. Muestre que $t = k/n$ es un estimador no sesgado de p , mientras que $t' = (k/n)^2$ no lo es para p^2 . Halle el bias de $(k/n)^2$, y a partir de éste encuentre un estimador no sesgado de p^2 .

Eficiencia y Mínima varianza

4. Escriba la función verosimilitud para un experimento binomial $B_k(n, p)$, y aplicando la relación de Cramer-Rao muestre que $t = k/n$ es un estimador 100% eficiente de p . ¿Cuánto vale $V(t)$?
5. Muestre que la aplicación de la desigualdad de Cramer-Rao al parámetro σ de la distribución normal $N(\mu, \sigma)$ establece que existe una única función de σ con estimador 100% eficiente, y permite encontrar su estimador, sesgo y varianza. Verifique sus conclusiones aplicando Cramer-Rao al parámetro σ^2 .
6. Sea la distribución exponencial, $f(x) = \lambda \exp(-\lambda x)$. Encuentre para que función $h(\lambda)$ existe un estimador 100% eficiente. Muestre que Cramer-Rao permite extraer directamente su sesgo y su varianza.
7. Compruebe que la distribución de Cauchy descentrada $f(x) = 1/[\pi(1 + (x - \mu)^2)]$ no posee un estimador eficiente para μ . ¿Cuál es la cota mínima para un estimador de μ no sesgado, con una muestra de tamaño n ?
Ayuda: $\int_0^\infty t^2 / (1 + t^2)^3 dt = \pi/16$

Suficiencia

8. Muestre que la distribución normal $N(\mu, \sigma)$, satisface la condición de Darmois para muchos parámetros

$$f(x, \underline{\theta}) = \exp\left(\sum_{j=1}^2 B_j(\underline{\theta})C_j(x) + D(\underline{\theta}) + E(x)\right)$$

para el caso de $\underline{\theta} = \{\mu, \sigma\}$.

- (a) Encuentre $B_1(\mu, \sigma)$, $B_2(\mu, \sigma)$, $C_1(x)$, $C_2(x)$, $D(\mu, \sigma)$ y $E(x)$, e identifique un par de estimadores suficientes para (μ, σ) que surgen de $C_1(x)$ y $C_2(x)$. ¿Es alguno de estos estimadores no sesgado para μ o para σ^2 ?
- (b) Suponga ahora que μ es conocido pero σ^2 no lo es. Redefina las funciones $B_j(\underline{\theta})$, $C_j(x)$, $D(\underline{\theta})$ y $E(x)$, y demuestre que $t(x) = \sum -\frac{1}{2}x_i^2 + \mu x_i$, es un estimador suficiente para σ^2 , pero que es sesgado. A partir de t , encuentre una transformación $t' = g(t)$ tal que t' sea no-sesgado. Muestre que otra posible definición de $B_j(\underline{\theta})$, $C_j(x)$, $D(\underline{\theta})$ y $E(x)$ hubiera permitido encontrar directamente t' .

Moraleja: los estimadores suficientes pueden no ser estimadores de los parámetros que queremos, pero una función de ellos sí. Además, los estadísticos suficientes no son únicos, y se pueden transformar sin perder su carácter de suficientes.

9. Considere una muestra $\{x_i\}$ extraída de $U[x; a]$, la distribución uniforme en $[a, a+1]$, con a real. Muestre que si bien \bar{x} es un estimador consistente y no sesgado de $E(x)$, no es un estimador suficiente. Note que en este caso no puede aplicar los teoremas de Cramer-Rao o Darmois (¿por qué?). Muestre asimismo que $\{x_{min}, x_{max}\}$ conforman un estimador suficiente (de dimensión 2) para $E(x)$.

Máxima verosimilitud

10. (a) Obtenga el estimador de máxima verosimilitud (MV) para:
- $\hat{\lambda}$ en la distribución exponencial $f(x; \lambda) = \lambda e^{-\lambda x}$;
 - $\hat{\tau}$ en la distribución exponencial con parametrización $f(x; \tau) = e^{-x/\tau}/\tau$.
- (b) Verifique que se satisface la invarianza ante transformación de parámetros de los estimadores MV.
- (c) Muestre que $\hat{\lambda}$ es sesgado, mientras que $\hat{\tau}$ no lo es.
(sugerencia: puede necesitar la identidad $\frac{1}{z} = \int_0^{+\infty} \exp(-tz) dt$, donde $z \geq 0$)
- (d) Muestre asimismo que $\hat{\lambda}$ es asintóticamente no sesgado, como todo estimador MV.
- (e) Halle las varianzas de $\hat{\lambda}$ y $\hat{\tau}$.
11. Sea $\{x_i\}$ una muestra tomada de una cierta distribución f . Muestre que el estimador MV no sesgado para $E(x)$ es:
- \bar{x} , si f es gaussiano;
 - $(x_{max} + x_{min})/2$ si f es uniforme;
 - la mediana si f es la doble exponencial $f(x) = (\lambda/2) \exp(-\lambda|x - \mu|)$.
12. Se realizan n mediciones $\{x_i\}$ cada una con distribución $N(\mu, \sigma_i)$ (o sea con distintos errores cada una).
- Muestre que el estimador MV de μ es $\hat{\mu} = (\sum x_i/\sigma_i^2)/(\sum 1/\sigma_i^2)$, el llamado “promedio pesado” o “promedio ponderado”. Interprete físicamente este resultado y obtenga su varianza. Verifique que si todos los σ_i son iguales, $\hat{\mu}$ corresponde al promedio de la muestra, como esperado.
 - Muestre que $\bar{x} = \sum x_i/n$ es también un estimador no sesgado de μ , pero de mayor varianza, como corresponde a un estimador que no es de MV.
 - Si los $\{x_i\}$, en vez de normal, tuvieran distribución uniforme $f(\mu, a_i) = \frac{1}{2a_i}, \mu - a_i \leq x \leq \mu + a_i$, muestre que el estimador MV de μ es el x_i con menor a_i .

Cuadrados mínimos

13. Considere la aplicación del principio de máxima verosimilitud, al ajuste de una función $y = f(x, \vec{a})$ sobre los puntos $\{x_i, y_i\}$.
- Muestre que si los y_i tienen distribución gaussiana respecto de $f(x_i, \vec{a})$ se obtiene el método de “cuadrados mínimos”.
 - En cambio, si y_i tiene distribución doble exponencial, se obtiene el método de “módulos mínimos”.
 - ¿Como modificaría cuadrados mínimos del punto (a) si en vez de datos (x_i, y_i) tiene que ajustar $y = f(x, \vec{a})$ a un histograma (x_i, n_i) siendo x_i el centro del bin i -ésimo y n_i su numero de entradas?
 - ¿Cual es la expresión a minimizar si se resuelve el ítem (c) por máxima verosimilitud?
- Sugerencia: por simplicidad considere que todas las mediciones en (a) tienen el mismo error σ y en (b) tienen el mismo parámetro λ
14. Muestre que al ajustar una recta $y = a_1 + a_2 x$ a un conjunto de datos no correlacionados $y_i \pm \sigma$, la expresión general de regresión lineal $\hat{\theta} = (\mathbb{A}^T \mathbb{V}^{-1} \mathbb{A})^{-1} \mathbb{A}^T \mathbb{V}^{-1} \mathbf{y}$, se reduce a la fórmula de “cuadrados mínimos”, ecuación 1 del problema 10 de la guía 5.
15. (a) Haga el ajuste de una parábola, $y = a_1 + a_2 x + a_3 x^2$, a los datos $\{x_i, y_i \pm \sigma_i\}$: $(-0.6, 5 \pm 2)$, $(-0.2, 3 \pm 1)$, $(0.2, 5 \pm 1)$ y $(0.6, 8 \pm 2)$.
(ayuda: el ejercicio está resuelto en la sección 10.2.5 del Frodesen)
- (b) Repita el ejercicio suponiendo todos los errores iguales $\sigma_i = \sigma$, y estime σ de los datos. [Rta: $\hat{\sigma} = 0.67$]