

Lennard-Jones


El hamiltoniano es

$$\mathcal{H} = \sum_{i=1}^N \left[\frac{p_i^2}{2m} + \sum_{i < j} V(r_{ij}) \right] \quad (1)$$

En el caso de Lennard-Jones (12,6)

$$V(r) = 4\epsilon \left[\left(\frac{\sigma}{r} \right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{r} \right)^6 \right] \quad (2)$$

Lennard-Jones(12,6)



Unidades reducidas

real	reducida
x	x/σ
V	$V/(N\epsilon)$
E	$E/(N\epsilon)$
T	KT/ϵ
t	$\sqrt{\epsilon/(m\sigma^2)} t$
ρ	$\sigma^3 \rho$
F	$(\sigma/\epsilon) F$
P	$(\sigma^3/\epsilon) P$
C_v	$C_v/(NK)$

Cálculo de las fuerzas y potenciales

En unidades reducidas

$$V(r) = 4 \left[\left(\frac{1}{r} \right)^{12} - \left(\frac{1}{r} \right)^6 \right] \quad (3)$$

$$f(r) = -\frac{dV}{dr} = 24 \left(\frac{1}{r} \right) \left[2 \left(\frac{1}{r} \right)^{12} - \left(\frac{1}{r} \right)^6 \right] \quad (4)$$

$$f_x = \frac{x}{r} f(r) \quad , \quad f_y = \frac{y}{r} f(r) \quad , \quad f_z = \frac{z}{r} f(r) \quad (5)$$

Potenciales truncados

- (a) Evaluar las fuerzas entre todas las partículas es muy costoso computacionalmente. Debemos “truncar” el potencial para el rango $r > 2.5 \sigma$.
- (b) También es necesario “truncar” el potencial para que sea válido aplicar las condiciones periódicas de contorno (a primeras imágenes). Se debe cumplir la condición

$$r_c < \frac{L}{2} \quad , \quad r_c = 2.5 \sigma \quad (6)$$

Notar que esta condición impone un límite a las altas densidades!

Efectos del “truncamiento”

- (a) Si truncamos, es equivalente a calcular $\tilde{V}(r) = V(r) \Theta(r_c - r)$

Entonces,

$$\tilde{f}(r) = -\frac{d\tilde{V}}{dr} = f(r) \Theta(r_c - r) - V(r_c) \delta(r_c - r) \quad (7)$$

Equivale a agregar un impulso a la distancia r_c .

- (b) Perdemos una cierta cantidad de energía media

$$\langle V_{\text{perd.}} \rangle = \int_{r_c}^{\infty} V(r) \rho 4\pi r^2 dr \approx -\rho \sigma^3 \epsilon \quad (8)$$

Soluciones al truncamiento

- (a) Desplazamos el potencial, aunque persiste el problema de la discontinuidad de la derivada r_c .

$$\mathcal{V} = V(r) - 4 \left[\left(\frac{1}{r_c} \right)^{12} - \left(\frac{1}{r_c} \right)^6 \right], \quad r_c = 2.5 \quad (9)$$

- (b) Una solución mejor es crear un polinomio interpolante entre $r = 2.5$ y $r = 3$.

Tabla de fuerzas y potenciales

Las fuerzas y los potenciales se tabulan para evitar la evaluación de una expresión compleja a cada paso.

- (a) Conviene que la tabla tenga r , r^2 , $f(r)$ y $V(r)$. El valor cuadrático r^2 se incluye para evitar calcular la raíz cuadrada a cada paso.
- (b) Para hallar los valores en la tabla, se usa método de bisección u otro similar.

```
while (rmax-rmin>dr)
{
    if (r2<(r2max+r2min)/2.0)    r2max=(r2max+r2min)/2.0
    if (r2>(r2max+r2min)/2.0)    r2min=(r2max+r2min)/2.0
    ...
}
```