

# FÍSICA TEÓRICA 1 – 1er. Cuatrimestre 2016

## Guía 3: Medios materiales y multipolos

1. Una esfera conductora de radio  $a$  está a potencial cero. Entre  $r = a$  y  $r = b$  hay un dieléctrico de permitividad  $\varepsilon$ , y ubicada a una distancia  $r'$  del origen hay una carga  $q$ . Considerar separadamente los dos casos  $a < b < r'$  y  $a < r' < b$ .

- (a) Hallar el potencial electrostático en todo punto del espacio.
- (b) Hallar las densidades de carga de polarización en volumen y superficie, y las densidades de carga libre en todo el espacio.
- (c) Analizar los casos  $\varepsilon = 1$  y  $\varepsilon \rightarrow \infty$ .

*Ayuda:* usando la forma genérica del potencial de una cáscara cargada frente a una esfera (que puede deducirse en una línea), bastará plantear una sola ecuación con una sola incógnita. En otro caso tendrá que plantear 5 ecuaciones con 5 incógnitas.

2. Una esfera homogénea de radio  $a$  tiene permitividad  $\varepsilon$  y es concéntrica con una cáscara esférica con densidad de carga  $\sigma = \sigma_0 \cos \theta$  y radio  $b$ . El conjunto se halla sumergido en un campo eléctrico uniforme en el infinito,  $\mathbf{E} = E_0 \hat{z}$ . Analizando por separado los casos  $a < b$  y  $b < a$ :

- (a) calcular el potencial en todo punto del espacio.
- (b) hallar la distribución de cargas de polarización en volumen y en superficie.

¿Coinciden los límites  $b \rightarrow a^+$  y  $b \rightarrow a^-$ ?

3. (a) En un medio de constante dieléctrica  $\varepsilon$  se sumerge una esfera conductora de radio  $a$  cargada con una carga total  $Q$ . Hallar los campos  $\mathbf{E}$  y  $\mathbf{D}$  en todo punto del espacio y las distribuciones de carga libre en el conductor y de polarización en el dieléctrico.

- (b) Calcular  $\mathbf{E}$  y  $\mathbf{D}$  si en lugar de fijar  $Q$ , la esfera conductora se conecta ahora a un potencial  $V$ .
- (c) Si bien existe una analogía formal entre ambos casos, hay una diferencia esencial entre ellos: la dependencia de los campos con  $\varepsilon$ . Explicar las causas de esta diferencia.

4. Un medio dieléctrico de permitividad  $\varepsilon$  ocupa el semiespacio con  $z < 0$ . A una altura  $d > 0$  sobre el dieléctrico hay una carga  $q$ .

- (a) Encuentre el potencial electrostático en todo el espacio: (i) usando separación de variables en coordenadas cartesianas, y (ii) usando separación de variables en coordenadas cilíndricas.
- (b) Para cada una de las expresiones obtenidas en (a), identifique la contribución al potencial asociada exclusivamente a la carga  $q$ . Es decir, escriba  $\phi = \phi_q + \phi_r$ , donde  $\phi_q$  es el potencial de la carga original. ¿A qué simple distribución de cargas puntuales puede atribuirse, en cada región, la parte restante del potencial,  $\phi_r$ ?
- (c) ¿A qué se reduce la solución cuando  $\varepsilon \rightarrow \infty$ ? ¿Cuál es la interpretación física de este resultado?

- (d) Generalice los resultados anteriores al caso en que el semiespacio superior está ocupado por un medio con permitividad  $\varepsilon_1$  y el inferior por un medio con permitividad  $\varepsilon_2$ . En términos de las permitividades, ¿cuál es la magnitud que caracteriza al problema?
- (e) Encuentre la función de Green para todo el espacio según las condiciones del ítem anterior. (Notar que la carga puede estar en cualquier posición, por encima y por debajo del plano  $z = 0$ .)

5. **Imán esférico.** Una esfera de radio  $a$  está uniformemente magnetizada con densidad  $\mathbf{M} = M\hat{z}$ .

- (a) Calcular los campos  $\mathbf{B}$  y  $\mathbf{H}$  usando la integral de Poisson para el potencial escalar magnético  $\Phi_{\mathbf{H}}$ , continuo en todo el espacio y tal que  $-\nabla\Phi_{\mathbf{H}} = \mathbf{H}$ . Identificar el problema eléctrico equivalente. Comparar el potencial en el exterior de la esfera con el que produciría un dipolo magnético puntual igual al momento dipolar total de la esfera.
- (b) Calcular el potencial escalar magnético  $\Phi_{\mathbf{H}}$  usando ahora separación de variables en esféricas.
- (c) Calcular el potencial vector  $\mathbf{A}$  mediante la integral de Poisson y, a partir de ahí,  $\mathbf{B}$  y  $\mathbf{H}$ .
- (d) La misma esfera magnetizada está ahora situada en un medio lineal, isótropo y homogéneo de permeabilidad  $\mu$ , que se extiende entre  $r = a$  y  $r = b > a$ , concéntrico con la esfera. Calcule los campos  $\mathbf{B}$  y  $\mathbf{H}$  en todo el espacio y encuentre el momento magnético total  $\mathbf{m}$  inducido en el medio. Verifique que para  $\mu = 1$  se obtienen los resultados de los ítems anteriores.


6. **Imán cilíndrico.** Un cilindro de radio  $a$  y longitud  $L$  está orientado según la dirección  $z$ , con sus tapas en  $z = \pm L/2$ , y está caracterizado por una densidad de magnetización uniforme  $\mathbf{M} = M\hat{z}$ .

- (a) Mediante la integral de Poisson, calcular el potencial vector  $\mathbf{A}$  en coordenadas cilíndricas desarrollado según las funciones de Bessel  $J_\nu(k\rho)$ , y a partir de ahí calcular los campos  $\mathbf{B}$  y  $\mathbf{H}$ . (Ayuda: en la integral de Poisson, escribir  $|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^{-1}$  según el tipo de desarrollo buscado.)
- (b) Mediante la integral de Poisson, calcular el potencial vector  $\mathbf{A}$  en coordenadas cilíndricas desarrollado como una integral de Fourier en  $z$ , y a partir de ahí calcular los campos  $\mathbf{B}$  y  $\mathbf{H}$ .
- (c) Calcular los campos  $\mathbf{B}$  y  $\mathbf{H}$  a partir de un potencial escalar magnético  $\Phi_{\mathbf{H}}$ , continuo en todo el espacio y tal que  $-\nabla\Phi_{\mathbf{H}} = \mathbf{H}$ . Escribir  $\Phi_{\mathbf{H}}$  como un desarrollo en las funciones de Bessel  $J_\nu(k\rho)$  o como una integral de Fourier en  $z$ . Comparar, según el caso, con los ítems (a) y (b).
- (d) ¿A qué distribución de corriente es equivalente este imán?
- (e) A partir del campo del imán, calcular el campo  $\mathbf{B}$  producido por un solenoide cilíndrico, de radio  $a$  y longitud  $L$ , por el que circula una corriente  $I$  y que tiene  $n$  espiras por unidad de longitud.
- (f) Calcular explícitamente los campos  $\mathbf{B}$  y  $\mathbf{H}$  del imán cuando  $L \rightarrow \infty$ .
- (g) Demuestre, por analogía, que el campo magnético de un solenoide infinito de sección arbitraria es cero en su exterior y constante en su interior.


7. **Problema sin cuentas I.** Las esferas de la figura tienen radios  $a$  y  $b$ , son conductoras y están aisladas. El espacio entre ellas está parcialmente ocupado por un dieléctrico de permitividad  $\varepsilon$ . Sólo una fracción  $x$  del volumen entre las esferas está ocupado por el dieléctrico. Los espacios vacíos empiezan en una esfera y terminan en la otra, no son uniformes y se extienden por trechos al azar, pero se caracterizan

por tener sus paredes orientadas según la dirección radial. Sobre la esfera de radio  $a$  se deposita una carga libre  $Q$ , y sobre la de radio  $b$  una carga libre  $-Q$ . Sólo se conocen los valores de estas cargas, no cómo se distribuyen.

- (a) Demuestre que un campo eléctrico con simetría esférica es compatible con las condiciones de contorno sobre todas las interfaces. De las hipótesis formuladas en el enunciado, ¿cuál es la que resulta fundamental para poder afirmar lo anterior?
- (b) Encuentre los campos  $\mathbf{E}$  y  $\mathbf{D}$  en la región entre las dos esferas y las distribuciones de carga libre y de polarización.



Problema 7



Problema 8

8. **Problema sin cuentas II.** Una corriente  $I$  fluye por un cable delgado a lo largo del eje  $z$  (ver figura). Tres semiplanos que forman entre sí ángulos  $\alpha_1, \alpha_2$  y  $\alpha_3$  ( $\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = 2\pi$ ) se intersectan a lo largo de ese eje. Las regiones entre los planos tienen permeabilidades  $\mu_1, \mu_2$  y  $\mu_3$ . Demuestre que un campo magnético con simetría cilíndrica es compatible con todas las condiciones del problema. Físicamente, ¿cuál es el motivo? Encuentre  $\mathbf{B}$  y  $\mathbf{H}$  en todo el espacio.

### Momentos multipolares

- 9. (a) Probar que los momentos multipolares de una distribución de carga con simetría esférica son nulos salvo el monopolar.
  - (b) Probar que el momento dipolar de una distribución de carga neutra no depende del origen. En general, probar que el primer momento multipolar no nulo es independiente del origen.
  - (c) Encontrar las expresiones para los momentos multipolares (en esféricas) de una distribución con simetría azimutal y escribir la expansión correspondiente.
10. Analizar los momentos multipolares, hasta el cuadrupolar, de las siguientes distribuciones de carga, y en el caso de tener momento cuadrupolar determinar sus ejes principales:
- (a) Un anillo de radio  $a$  cargado uniformemente con carga total  $Q$ .
  - (b) Un disco cargado con una distribución cilíndricamente simétrica respecto de su eje.
  - (c) Un cubo uniformemente cargado en volumen. Estimar el error en el **campo eléctrico** si a un cubo de 10 cm de lado se lo considera como una carga puntual a distancias del orden de 1 m de su centro. ¿A qué distancia el error es del orden del 1 %?

11. Calcule todos los momentos multipolares del problema 17 de la Guía 2 (anillo de radio  $b$ , cargado uniformemente, concéntrico con una esfera a tierra de radio  $a < b$ ), y del problema 19 (disco de radio  $a$  cargado uniformemente).
- 12.\* (Carnaval de índices del terror.) Para una distribución de carga acotada, lejos del sistema de cargas el campo puede desarrollarse en potencias de  $1/r$  a partir de la integral de Poisson,

$$\Phi(\mathbf{r}) = \int_V d^3\mathbf{r}' \frac{\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} = \int_V d^3\mathbf{r}' \frac{\rho(\mathbf{r}')}{r} \left[ 1 + \frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{r}'}{r^2} + \dots \right] = \Phi_1(\mathbf{r}) + \Phi_2(\mathbf{r}) + \Phi_3(\mathbf{r}) + \dots$$

Los primeros términos se escriben como

$$\Phi_1(\mathbf{r}) = \frac{Q}{r}, \quad \Phi_2(\mathbf{r}) = \frac{r_i p_i}{r^3}, \quad \Phi_3(\mathbf{r}) = \frac{r_i r_j Q_{ij}}{2r^5},$$

donde  $Q = \int d^3\mathbf{r} \rho(\mathbf{r})$ ,  $p_i = \int d^3\mathbf{r} \rho(\mathbf{r}) r_i$ ,  $Q_{ij} = \int d^3\mathbf{r} \rho(\mathbf{r}) (3r_i r_j - \delta_{ij} r^2)$ . Aquí los  $r_i$  son las componentes cartesianas del vector  $\mathbf{r}$ . Sería bueno que antes de seguir con el ejercicio, deduzca por su cuenta el término cuadrupolar  $\Phi_3$ , junto con el tensor  $Q_{ij}$ .

Continúe el desarrollo de  $\Phi$  hasta los dos órdenes siguientes, es decir, hasta términos de orden  $1/r^5$ . El resultado debe escribirse en la forma

$$\Phi_4(\mathbf{r}) = \frac{r_i r_j r_k Q_{ijk}^{(3)}}{3! r^7}, \quad \Phi_5(\mathbf{r}) = \frac{r_i r_j r_k r_l Q_{ijkl}^{(4)}}{4! r^9},$$

donde los tensores  $Q_{ij\dots}^{(n)}$  son completamente simétricos, y además  $Q_{ij\dots ik\dots}^{(n)} = 0$  para la suma sobre cualquier par de índices (¿por qué?). ¿Cuántos elementos independientes tiene un tal tensor? Luego, calcule hasta el primer orden no nulo (además del monopolar) el potencial de un cubo macizo cargado y revea el problema (10c).

- 13.\* **¿Es lo mismo tener una gran distribución de carga lejos que una pequeña distribución cerca?** Calcular la densidad  $\rho_\alpha$  de una distribución de carga  $\rho$  que se ha expandido o contraído uniformemente un factor  $\alpha$ . Expansión significa  $\alpha > 1$ , y contracción,  $0 < \alpha < 1$ . Geométricamente, la transformación lleva el punto  $\mathbf{r}$  al punto  $\alpha\mathbf{r}$ , y la carga contenida en el elemento de volumen  $d^3\mathbf{r}$  al elemento de volumen  $d^3(\alpha\mathbf{r})$ . ¿Cuál es el potencial  $\Phi_\alpha$  de la distribución transformada en términos del potencial original  $\Phi$ ? ¿Cómo se relacionan entre sí los momentos multipolares de orden  $l$ ,  $Q_\alpha^{(lm)}$ , de la distribución transformada y los momentos  $Q^{(lm)}$  de la original? Volviendo a la pregunta inicial: ¿en qué sentido es equivalente ver una distribución desde una distancia  $L = \alpha d$ , con  $\alpha > 1$ , a verla desde una distancia  $d$  pero contraída un factor  $1/\alpha$ ?

Respuestas:  $\rho_\alpha(\mathbf{r}) = \rho(\mathbf{r}/\alpha)$ ,  $d^3(\alpha\mathbf{r}) = \alpha^3 d^3\mathbf{r}$ ,  $\Phi_\alpha(\mathbf{r}) = \Phi(\mathbf{r}/\alpha)$ ,  $Q_\alpha^{(lm)} = \alpha^{l-3} Q^{(lm)}$ .