

# Boltzmann & transporte

Lectura: K. Huang, Cap. 5; M. Kardar Cap. 3; F. Reif. Cap 12-13.

## » La ecuación de Boltzmann

$$\begin{aligned} \left( \frac{\partial}{\partial t} + \mathbf{F} \cdot \nabla_{\mathbf{p}} + \frac{\mathbf{p}}{m} \cdot \nabla_{\mathbf{r}} \right) f(\mathbf{r}, \mathbf{p}, t) &= \left. \frac{\partial f}{\partial t} \right|_{\text{col}} \\ &= \int d^3 p_2 d\Omega \frac{d\sigma}{d\Omega} |v_2 - v_1| [f(\mathbf{p}'_1) f(\mathbf{p}'_2) - f(\mathbf{p}_1) f(\mathbf{p}_2)] \end{aligned}$$

donde  $f(\mathbf{r}, \mathbf{p}, t)$  es la distribución de 1 partícula, i.e,  $dN = f(\mathbf{r}, \mathbf{p}, t) d^3 r d^3 p$  es el número de partículas con posición entre  $\mathbf{r}$  y  $\mathbf{r} + d\mathbf{r}$  y momento entre  $\mathbf{p}$  y  $\mathbf{p} + d\mathbf{p}$

## » Promedios locales

Sea  $\mathcal{O}(\mathbf{r}, \mathbf{p})$  vamos a trabajar con promedios sobre  $\mathbf{p}$

$$\langle \mathcal{Q} \rangle(\mathbf{r}, t) = \frac{\int \mathcal{O}(\mathbf{r}, \mathbf{p}) f(\mathbf{r}, \mathbf{p}, t) d^3 p}{\underbrace{\int f(\mathbf{r}, \mathbf{p}) d^3 p}_{n(\mathbf{r}, t)}} \quad \left\{ \begin{array}{l} \mathbf{u}(\mathbf{r}, t) n(\mathbf{r}, t) = \int \frac{\mathbf{p}}{m} f(\mathbf{r}, \mathbf{p}, t) d^3 p \\ \epsilon(\mathbf{r}, t) n(\mathbf{r}, t) = \int \frac{m}{2} \left( \frac{\mathbf{p}}{m} - \mathbf{u} \right)^2 f(\mathbf{r}, \mathbf{p}, t) d^3 p \\ \vdots \end{array} \right.$$

## » Leyes de Conservación

¿Qué pasa con las magnitudes ( $\chi$ ) que se conservan microscópicamente?

$$\chi(p_1, q, t) + \chi(p_2, q, t) = \chi(p'_1, q, t) + \chi(p'_2, q, t)$$

## » Conservación del número de partículas ( $\chi = 1$ )

$$\int d^3p \left( \frac{\partial}{\partial t} + \mathbf{F} \cdot \nabla_p + \frac{\mathbf{p}}{m} \cdot \nabla_r \right) f(\mathbf{r}, \mathbf{p}, t) = \int d^3p \frac{\partial f}{\partial t} \Big|_{\text{col}} \xrightarrow{0}$$
$$\int d^3p \partial_t f(\mathbf{r}, \mathbf{p}, t) + \int d^3p \mathbf{F} \cdot \nabla_p f + \int d^3p \frac{\mathbf{p}}{m} \cdot \nabla_r f = 0$$
$$\partial_t n(\mathbf{r}, t) + \nabla_r \cdot \int d^3p \frac{\mathbf{p}}{m} f = 0$$

$$\partial_t n + \nabla \cdot (n\mathbf{u}) = 0$$

Momento lineal

$$\chi = \frac{\mathbf{p}}{m} - \mathbf{u}$$

$$\partial_t \mathbf{u} + (\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u} = \frac{\mathbf{F}}{m} - \frac{1}{mn} \nabla \cdot \mathbb{P}$$

con

$$P_{ij}(\mathbf{r}, t) =$$

$$\int (p_i/m - u_i)(p_j - mu_j) f(\mathbf{r}, \mathbf{p}, t) d^3p$$

Energía cinética

$$\chi = \frac{m}{2} (\mathbf{p}/m - \mathbf{u})^2$$

La densidad local de energía cinética,

$$\varepsilon = \left\langle \frac{(\mathbf{p} - m\mathbf{u})^2}{2m} \right\rangle$$

$$\partial_t \varepsilon + \mathbf{u} \cdot \nabla \varepsilon = -\frac{1}{n} \nabla \cdot \mathbf{q} - \frac{1}{n} P_{ij} u_{ij}$$

con

$$\mathbf{q} = \frac{1}{m} \int (\mathbf{p} - m\mathbf{u}) \frac{1}{2m} (\mathbf{p} - m\mathbf{u})^2 f(\mathbf{r}, \mathbf{p}, t) d^3p$$

$$\text{y } u_{ij} = \frac{1}{2} (\partial_j u_i + \partial_i u_j)$$



## » ¿Cada cuánto choca una partícula?

El No. total de colisiones por unidad de tiempo es

$$Z = \int d^3r d^3p_1 d^3p_2 \sigma |\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2| f(r, p_1, t) f(r, p_2, t) \Rightarrow \tau_c \simeq \frac{N}{2Z}$$

En un sistema uniforme en equilibrio  $\tau_c = \frac{1}{4n\sigma} \sqrt{\frac{m\pi}{k_B T}}$  y el camino libre medio

$$\lambda = \bar{v} \tau_c$$



## » Límite de colisiones muy frecuentes

Si  $\tau_c \ll \tau_U$

$$f(r, \mathbf{p}, t) = f^{\text{MB local}}[\mathbf{u}, \beta, n] = n(r, t) \left( \frac{\beta(r, t)}{2\pi m} \right)^{3/2} e^{-\frac{\beta(r, t)}{2m} (\mathbf{p} - m\mathbf{u}(r, t))^2} \quad \text{Equilibrio local}$$

$$P_{ij} = \delta_{ij} P = \frac{\delta_{ij}}{3m} \int (\mathbf{p} - m\mathbf{u})^2 f(r, \mathbf{p}, t) d^3p \quad \mathbf{q} = 0$$

$$= \frac{1}{3m} \int p^2 n \left( \frac{\beta}{2\pi m} \right)^{3/2} e^{-\frac{\beta}{2m} p^2} d^3p$$

$$= \frac{1}{\cancel{3m} \cancel{\beta}} \frac{mn}{\beta} = n(r, t) k_B T(r, t)$$

$$\epsilon = \frac{3}{2} n(r, t) k_B T(r, t)$$



$$\partial_t n + \nabla \cdot (n\mathbf{u}) = 0, \quad m [\partial_t \mathbf{u} + (\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u}] = \mathbf{F} - \frac{\nabla P}{n}, \quad [\partial_t T + \mathbf{u} \cdot \nabla T] = -\frac{2}{3} T \nabla \cdot \mathbf{u}$$

¿Qué pasa con la ecuación de  $T(r, t)$ ?

$$\partial_t n + (\mathbf{u} \cdot \nabla) n = -n \nabla \cdot \mathbf{u} \quad \text{y} \quad -\frac{3}{2} \frac{n}{T} [\partial_t T + (\mathbf{u} \cdot \nabla) T] = n \nabla \cdot \mathbf{u}$$


$$\partial_t n - \frac{3}{2} \frac{n}{T} \partial_t T + (\mathbf{u} \cdot \nabla) n - \frac{3}{2} \frac{n}{T} (\mathbf{u} \cdot \nabla) T = 0$$

$$D[n] - \frac{3}{2} \frac{n}{T} D[T] = 0 \quad \text{con} \quad D[n] = \partial_t n + (\mathbf{u} \cdot \nabla) n$$

$$0 = \frac{1}{T^{3/2}} \left[ D[n] - \frac{3}{2} \frac{n}{T} D[T] \right] = D \left[ \frac{n}{T^{3/2}} \right]$$

$$\frac{n}{T^{3/2}} = \text{constante} \quad S = -k_B H = N \left\{ \ln \left[ n \left( \frac{\beta}{2\pi m} \right)^{3/2} \right] - \frac{3}{2} \right\}$$

## » Propagación de Ondas



Con lo cual,

$$\frac{\partial^2 \delta n}{\partial t^2} = c_s^2 \nabla^2 \delta n$$

Si  $\mathbf{u} = O(1)$ ,  $n(\mathbf{r}, t) = n_0(\mathbf{r}) + \delta n(\mathbf{r}, t)$

$$\partial_t n + \nabla \cdot (n\mathbf{u}) = 0 \quad \rightarrow \quad \partial_t \delta n + \nabla \cdot n_0 \mathbf{u} = 0$$

$$m [\partial_t \mathbf{u} + (\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u}] = -\frac{\nabla P}{n} = -\frac{\nabla(n k_B T)}{n} \quad \rightarrow$$

$$m n_0 \partial_t \mathbf{u} + \left. \frac{\partial P}{\partial n} \right|_S \nabla \delta n = 0$$

$$\partial_t^2 \delta n - \frac{1}{m} \nabla \cdot \left( n_0 \left. \frac{\partial P}{\partial n} \right|_S (n_0) \nabla \delta n \right) = 0 \quad \text{si } n_0 = \text{cte}$$

$c_s$ , con  $c_s^2 = n_0 \left. \frac{\partial P}{\partial n} \right|_S (n_0)$ , es la velocidad del sonido

## » Cerca del hidrodinámico – Aproximación del tiempo de relajación

Si  $f(r, p, t) = \overbrace{f^{(0)}(r, p, t)}^{\text{local}} + g(r, p, t)$ . Así

$$\begin{aligned}\left. \frac{\partial f}{\partial t} \right|_{\text{col}} &= \int d^3 p_2 d\Omega \frac{d\sigma}{d\Omega} |\mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_1| [f(p'_1) f(p'_2) - f(p_1) f(p_2)] \\ &\simeq \int d^3 p_2 d\Omega \frac{d\sigma}{d\Omega} |\mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_1| [f^{(0)}(p'_1) g(p'_2) + g(p'_1) f^{(0)}(p'_2) \\ &\quad - f^{(0)}(p_1) g(p_2) - g(p_1) f^{(0)}(p_2)]\end{aligned}$$

En la aproximación del tiempo de relajación ( $\tau$ ) tenemos

$$\left. \frac{\partial f}{\partial t} \right|_{\text{col}} \simeq -\frac{g}{\tau} = -\frac{f - f^{(0)}}{\tau}$$

$$\left(\partial_t + \mathbf{F} \cdot \nabla_p + \frac{\mathbf{p}}{m} \cdot \nabla_r\right) (f^{(0)} + g) \simeq -\frac{g}{\tau} \quad \text{a primer orden entonces}$$

$$g \simeq -\tau \left(\partial_t + \mathbf{F} \cdot \nabla_p + \frac{\mathbf{p}}{m} \cdot \nabla_r\right) f^{(0)}$$

### Flujo de calor – Conductividad térmica

$$\mathbf{q} = \int \mathbf{v} \frac{p^2}{2m} f d^3p = \int \mathbf{v} \frac{p^2}{2m} g d^3p$$

$$= -\tau \int \mathbf{v} \frac{p^2}{2m} \frac{\mathbf{p}}{m} \cdot \nabla_r f^{(0)} d^3p$$

$$\mathbf{q} = -\kappa \nabla T$$

