

## Mecánica Clásica – 1er. Cuat. 2017

**Guía 2:** *Principios variacionales.*

**Problema 1:** Suponga que sabe experimentalmente que una partícula cae una distancia dada  $y$  en un tiempo  $t_d = \sqrt{2y_d/g}$ , pero que no se conoce el tiempo de caída para otras distancias. Suponga además que el lagrangiano del problema se conoce pero en lugar de resolver la ecuación de movimiento se prueba una forma funcional  $y = a + bt + ct^2$ . Muestre que la integral  $I = \int \mathcal{L} dt$  resulta un extremo para valores reales de los coeficientes sólo cuando  $a = 0$ ,  $b = 0$  y  $c = -g/2$ .

**Problema 2:** Una partícula se encuentra sometida a un potencial  $V(r) = -k/r$ , de tipo gravitatorio. Suponiendo que las órbitas son circulares, encuentre la relación entre los períodos y los radios de las órbitas utilizando el principio variacional de Hamilton. *Ayuda: considere la ecuación paramétrica de la elipse  $x(\tau) = a \cos(\alpha\tau)$ ,  $y(\tau) = b \sin(\alpha\tau)$ , y apartamientos de la trayectoria circular variando  $a$  ó  $b$ .*

**Problema 3:** Según Fermat, la luz sigue una trayectoria que hace extrema la integral

$$\int_1^2 n(x, y) ds,$$

donde  $n(x, y)$  es el índice de refracción del medio inhomogéneo que la luz atraviesa. El problema se supone plano. Muestre que si  $n(x, y) = n_0(1 + y/h)$ , donde  $n_0$  y  $h$  son constantes, la trayectoria de la luz está dada por  $y = -h + (\alpha h/n_0) \cosh(\beta + n_0 x/h\alpha)$ ;  $\alpha$  y  $\beta$  constantes de integración. *Ayuda: considere las ecuaciones de Euler-Lagrange.*

**Problema 4:** ¿Son afectadas las ecuaciones de movimiento si al lagrangiano se le agrega una derivada total con respecto al tiempo?

**Problema 5:** Hallar la curva de longitud mínima que une dos puntos de la superficie de un cilindro.

**Problema 6:** ¿Cambia la forma de un lagrangiano cuando se lo escribe en distintas coordenadas generalizadas?. Muestre un ejemplo.

**Problema 7:** Muestre que el lagrangiano  $\mathcal{L}(q, \dot{q}, \ddot{q}, t) = a\ddot{q} + bt\ddot{q} + \mathcal{L}'(q, \dot{q}, t)$  ( $a$  y  $b$  son constantes arbitrarias) conduce a ecuaciones de movimiento que son de segundo orden.

**Problema 8:** *Problema de la braquistócrona.* Demuestre que la curva que hace mínimo el tiempo de descenso entre dos puntos en la cercanías de la superficie terrestre es una cicloide.