

Gentlemen! The views of space and time which I want to present to you arose from the domain of experimental physics, and therein lies their strength. Their tendency is radical. From now onwards space by itself and time by itself will recede completely to become mere shadows and only a type of union of the two will still stand independently on its own.

*Hermann Minkowski, Space and Time  
(1908)*

La teoría cuántica de campos que estudiaremos es una teoría invariante ante el grupo de simetrías relativistas. Este grupo es el de Poincaré, el cual contiene al grupo de Lorentz. Gracias al aporte de Minkowski, este grupo puede pensarse como el grupo de transformaciones que deja invariante a una métrica pseudoeuclídea que lleva su nombre. En esta guía veremos aspectos de este grupo y su álgebra, comenzando con su análogo euclídeo. Veremos cómo aparecen los espinores como representación del grupo de Lorentz y cómo las ecuaciones de onda relativistas manifiestan la simetría de Poincaré. Todo el análisis de esta guía es estrictamente clásico, por lo que no debe pensarse a ninguno de los campos de las ecuaciones relativistas como funciones de onda en una teoría cuántica.

## Preliminares: grupo Euclídeo

- 1 Considerare las transformaciones lineales en  $\mathbb{R}^D$  que dejan invariante la forma cuadrática  $x^T x$ , siendo  $x \in \mathbb{R}^D$ .
  - (a) Muestre que la matriz  $M$  que implementa la transformación lineal debe cumplir  $M^T M = \mathbb{I}$ , y como consecuencia de esto  $|\det(M)| = 1$ . El grupo de matrices que cumple  $M^T M = \mathbb{I}$  se conoce como grupo ortogonal y se lo denota como  $O(D)$ .
  - (b) Al subgrupo de matrices de  $O(D)$  con determinante  $+1$  se lo denomina  $SO(D)$  (“S” por “special”). Argumente que para el subgrupo de matrices de  $O(D)$  conectadas continuamente con la identidad el determinante debe ser  $+1$ . (Ocurre que la condición determinante  $+1$  garantiza que la matriz se halla en el subgrupo conectado con la identidad, de modo que  $SO(D)$  tiene una sola componente conexa que incluye a la identidad).
- ✓ Resuelto en la sección 1.1.1 de las notas de la práctica.
- 2 El grupo  $SU(2)$  está formado por las matrices de  $2 \times 2$  con coeficientes complejos que son unitarias y tienen determinante 1. Mostrar que los elementos de este grupo se pueden asociar a los puntos de la esfera  $S^3$ .
- 3 Una matriz cualquiera  $M$  del grupo  $SO(D)$  puede escribirse como la exponencial de otra:  $M = e^A$ . El conjunto de matrices que aparecen en la exponencial forman un álgebra, tomando el corchete como el conmutador entre matrices.
  - (a) Muestre que esta matriz  $A$  debe ser antisimétrica.
  - (b) Definimos la *dimensión* de un grupo de Lie como la dimensión del espacio vectorial de su álgebra asociada. A partir del inciso anterior, muestre que la dimensión de  $SO(D)$  es  $D(D - 1)/2$ .

- (c) Los generadores del espacio vectorial de matrices antisimétricas (cuya exponencial genera el grupo) pueden escribirse convenientemente en términos de una colección de matrices  $\Sigma_{IJ}$  ( $I, J = 1, \dots, D$ ), siendo por definición  $\Sigma_{IJ} = -\Sigma_{JI}$  (note que aquí  $I$  y  $J$  no son las componentes de la matriz sino un doble índice que etiqueta cada matriz). En términos de estas, la matriz  $M$  de  $SO(D)$  puede escribirse como:

$$M = e^{\frac{1}{2}\Sigma_{IJ}\omega^{IJ}},$$

siendo  $\omega^{IJ}$  parámetros reales sujetos a la relación  $\omega^{IJ} = -\omega^{JI}$ . Para el caso  $D = 3$ , halle un conjunto de matrices  $\Sigma_{IJ}$  y parámetros  $\omega^{IJ}$  en términos de los generadores y ángulos usuales de rotación que expresan la rotación en torno a un eje. Relacione el índice  $IJ$  con el plano de rotación.

✓ **Resuelto en la sección 1.1.3 de las notas de la práctica.**

- 4 De las propiedades del grupo  $SO(D)$  se puede ver que las matrices  $\Sigma_{IJ}$  satisfacen:

$$[\Sigma_{IJ}, \Sigma_{MN}] = \delta_{IN}\Sigma_{JM} + \delta_{JM}\Sigma_{IN} - \delta_{IM}\Sigma_{JN} - \delta_{JN}\Sigma_{IM}$$

Verifique en el caso  $D = 3$  estas relaciones (en física, suelen redefinirse los generadores multiplicándolos por  $i$  de modo que resultan ser matrices hermíticas. Con esta redefinición, aparece un factor  $i$  en el miembro derecho y hay signos de diferencia). Verifique también la antisimetría que debe existir al permutar los índices  $I, J, M, N$ .

- 5 Considere ahora una transformación que involucre traslaciones en  $\mathbb{R}^D$ . Denotando por  $(M, a)$  a la transformación  $X \rightarrow MX + a$ , siendo  $a$  un vector y  $M$  una matriz de rotación:

- (a) Halle la ley de composición de dos transformaciones consecutivas  $(M_2, a_2) \circ (M_1, a_1)$ . Es decir, exprese el resultado de la composición de estas dos como una nueva transformación  $(M_3, a_3)$
- (b) Considerando  $(M_2, a_2) \circ (M_1, a_1) - (M_1, a_1) \circ (M_2, a_2)$  a primer orden en los parámetros de rotación y traslación, halle las reglas de conmutación entre los generadores de la traslación y rotación.

Una traslación no deja invariante la forma  $X^T X$  pero sí la distancia euclídea entre dos puntos:  $(X - Y)^T(X - Y)$ . Es por eso que al grupo de rotaciones más traslaciones se lo denomina *grupo euclídeo*.

✓ **Un ejercicio similar pero aplicado al grupo de Poincaré es el ejercicio 1.11 del libro de Radovanovic.**

- 6 Las representaciones de  $SU(2)$  (que localmente es equivalente a  $SO(3)$ ) se pueden construir a partir de representaciones de otro álgebra, el *álgebra de Clifford*

$$\{\gamma_i, \gamma_j\} = 2\delta_{ij}1_{N \times N},$$

con  $i, j = 1, 2, 3$ , siendo  $\gamma^i$  matrices de dimensión  $N \times N$ . Para el caso  $N = 2$  existe una elección única, a menos de cambios de base, para matrices de  $2 \times 2$ , que corresponde a  $\gamma_i = \sigma_i$ , donde las  $\sigma_i$  ( $i = 1, 2, 3$ ) son las matrices de Pauli.

- (a) Muestre que  $\Sigma_{ij} \equiv \frac{i}{4}[\sigma_i, \sigma_j]$  son generadores del álgebra  $su(2) \approx so(3)$ . A esa representación del grupo  $SU(2)$  por medio matrices de  $2 \times 2$  se la denomina *espinorial*.

- (b) Un espinor es una representación de  $SU(2)$  dada por una 2-upla  $\xi = \begin{bmatrix} \xi_1 \\ \xi_2 \end{bmatrix}$ , en la que la acción del grupo  $SU(2)$  es

$$\xi \rightarrow e^{i\frac{1}{2}\omega_{ij}\Sigma_{ij}}\xi$$

Verifique que esa es la ley de transformación de espinores que conoce.

## Grupo y álgebra de Poincaré

- 7] Considere una transformación dada por una matriz  $\Lambda$

$$x^\mu \rightarrow x'^\mu = \Lambda^\mu_\nu x^\nu,$$

que deje invariante la forma  $x^T \eta x$ , siendo  $x$  la coordenada de un punto del espacio-tiempo 4-dimensional y <sup>1</sup>

$$(\eta_{\mu\nu}) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}.$$

En componentes,  $x^T \eta x = \eta_{\mu\nu} x^\mu x^\nu$ ,  $\mu = 0, 1, 2, 3$ . Al grupo de transformaciones lineales que deja esa forma cuadrática invariante se lo llama *grupo de Lorentz*.

Halle la condición análoga a la del grupo de rotaciones (Ejercicio 1.a) para la matriz  $\Lambda$ . Muestre que la matriz  $\lambda$  definida por  $\Lambda = e^\lambda$  satisface  $\lambda_{\mu\nu} = -\lambda_{\nu\mu}$ , siendo  $\lambda_{\mu\nu} \equiv \eta_{\mu\rho} \lambda^\rho_\nu$ . Escriba explícitamente las matrices de la base del álgebra.

✓ **Resuelto en la sección 1.4.1 de las notas de la práctica.**

- 8] Para el caso del grupo de Lorentz, la condición determinante igual a 1 no es suficiente para caracterizar la parte conectada continuamente con la identidad. Busque en la literatura cuáles son las 4 componentes conexas del grupo  $SO(3, 1)$  y cuál de estas esta conectada continuamente con la identidad.

✓ **Resuelto en la sección 1.4.2 de las notas de la práctica.**

- 9] Muestre que las relaciones entre los generadores  $M_{\mu\nu} = -M_{\nu\mu}$  que definen el álgebra de Lorentz

$$[M_{\mu\nu}, M_{\rho\sigma}] = i(g_{\mu\sigma}M_{\nu\rho} + g_{\nu\rho}M_{\mu\sigma} - g_{\mu\rho}M_{\nu\sigma} - g_{\nu\sigma}M_{\mu\rho})$$

pueden re-escribirse como:

$$[J_i, J_j] = i\epsilon_{ijk}J_k \quad [K_i, K_j] = -i\epsilon_{ijk}J_k \quad [J_i, K_j] = i\epsilon_{ijk}K_k$$

con  $J_i \equiv \frac{1}{2}\epsilon_{ijk}M_{jk}$  y  $K_i \equiv M_{i0}$ .

✓ **Resuelto en la sección 1.4.3 de las notas de la práctica.**

- 10] Definiendo  $\bar{A} = \frac{1}{2}(\bar{J} - i\bar{K})$  y  $\bar{B} = \frac{1}{2}(\bar{J} + i\bar{K})$  (siendo  $J_i$  y  $K_i$  los generadores de las rotaciones y boost respectivamente) muestre que el álgebra de Lorentz es suma directa de dos  $su(2)$ . De aquí se desprende que las representaciones del grupo de Lorentz se etiquetan por el par de semienteros  $(j_1, j_2)$ , que corresponden al espín de la representación de cada  $su(2)$ .

✓ **Resuelto en la sección 1.4.3 de las notas de la práctica.**

<sup>1</sup>Tenga presente que en muchos textos se utiliza otra convención para la métrica (*West coast convention*) que difiere en un signo menos de esta (*East coast convention*), lo que impacta en otras ecuaciones que aparecerán en el curso. Un libro muy bueno que sigue la convención que vamos a usar es el de Weinberg. Pueden usar la convención que deseen mientras sean consistentes.

- 11 El grupo de Poincaré es el análogo al grupo Euclídeo definido en el Ejercicio 4. Hallar las relaciones que definen el álgebra de Poincaré evaluando la diferencia al realizar las transformaciones sucesivas  $(\Lambda_1, a_1)$  y  $(\Lambda_2, a_2)$  sobre un cuadrivector permutando el orden entre ellas. La notación  $(\Lambda, a)$  indica la transformación  $x^\mu \rightarrow \Lambda^\mu_\nu x^\nu + a^\mu$ .

✓ **El resultado está dado en la sección 1.5 de las notas de la práctica.**

- 12 Operadores de Casimir del grupo de Poincaré.
- (a) Mostrar que los operadores  $P^2 = P^\mu P_\mu$  y  $W^2$ , siendo  $W^\mu = \frac{1}{2}\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma} P_\nu M_{\rho\sigma}$  el vector de Pauli-Lubanski, conmutan con todos los generadores del álgebra.
- (b) Muestre que, para una representación no masiva (es decir, con  $P^2 = m^2 = 0$ ) en la que  $P_i \neq 0$ ,  $W^\mu$  es proporcional a  $P^\mu$ . La constante de proporcionalidad se conoce como *helicidad*.

### Ecuaciones de onda relativistas

- 13 Considere la ecuación de (Oskar)Klein - (Walter)Gordon:

$$(\eta^{\mu\nu} \partial_\mu \partial_\nu + m^2) \phi = 0$$

siendo  $\phi$  una función de  $\mathbb{R}^4$  en  $\mathbb{C}$ .  $\phi$  puede considerarse como una representación del grupo de Lorentz del tipo  $(0, 0)$  (ver Ejercicio 10).

- (a) Muestre que si  $\phi$  es solución, también lo es  $\phi \circ (\Lambda, a)$  (invariancia de Poincaré de la ecuación).
- (b) Verifique que esta ecuación es invariante ante el grupo discreto de transformaciones  $C$  y  $P$  y  $T$ , siendo  $C$  la operación de conjugar,  $P$  la composición con inversión espacial y  $T$  la composición con inversión temporal.

✓ **Resuelto en la sección 2.1 de las notas de la práctica.**

- 14 Considere la ecuación de Klein-Gordon para un campo complejo.
- (a) Muestre que la cantidad (llamada *corriente*, por su interpretación como corriente conservada que se verá en la guía siguiente)  $j_\mu \equiv -\frac{i}{2}(\varphi^* \partial_\mu \varphi - \varphi \partial_\mu \varphi^*)$  satisface la ecuación de continuidad  $\partial_\mu j^\mu = 0$  si  $\varphi$  satisface la ecuación de Klein-Gordon.
- (b) Evalúe la corriente para las soluciones de frecuencia positiva y negativa  $\varphi_\pm(x, t) = e^{\mp i k x}$ , siendo  $k_0 = \sqrt{\mathbf{k}^2 + m^2}$ .
- (c) Muestre que la componente  $j_0$  no es definida positiva (o negativa) en el espacio de soluciones generado por soluciones de frecuencia positiva y negativa.

✓ **Resuelto en la sección 2.2 de las notas de la práctica.**

- 15 Considere ahora la ecuación de Dirac:

$$(i\gamma^\mu \partial_\mu - m)\Psi = 0$$

siendo  $\Psi$  una función del espacio-tiempo en  $\mathbb{C}^4$ . Las  $\gamma^\mu$  son matrices que cumplen  $\{\gamma^\mu, \gamma^\nu\} = 2\eta^{\mu\nu} 1_{4 \times 4}$ . Por cada solución  $\Psi$  de la ecuación de Dirac, es posible generarse otra solución  $\tilde{\Psi}$ , definida por  $\tilde{\Psi}(x) \equiv S(\Lambda)\Psi(\Lambda^{-1}x)$ , con  $S(\Lambda)$  una matriz asociada a la transformación de Lorentz.

- (a) Muestre que  $S$  debe cumplir:  $S^{-1}\gamma^\mu S = \Lambda^\mu_\nu \gamma^\nu$ .
- (b) Compruebe que  $S \equiv e^{\frac{i}{2}\Sigma_{\mu\nu}\omega^{\mu\nu}}$ , siendo  $\Sigma_{\mu\nu} = \frac{i}{4}[\gamma_\mu, \gamma_\nu]$ , satisface la condición previa a primer orden en el parámetro  $\omega^{\mu\nu}$  de la transformación de Lorentz  $\Lambda$ .

✓ Resuelto en la sección 2.3 de las notas de la práctica.

16 Encuentre las propiedades de transformación ante el grupo de Lorentz de las formas bilineales  $\bar{\Psi}\Psi$  y  $\bar{\Psi}\gamma^\mu\Psi$ .

✓ Discutido en el video de la práctica subido el 04/05/2020.

17 Verifique que las matrices  $\Sigma$  satisfacen el álgebra de Lorentz. (Ayuda: use resultados del Ejercicio 15 sobre el conmutador  $[\gamma_\mu, \Sigma_{\nu\rho}]$  y utilice la identidad de Jacobi).

18 La representación del grupo de Lorentz (incluyendo paridad) de dimensión más baja es una suma directa de representaciones de espín  $\frac{1}{2}$ :  $(\frac{1}{2}, 0) \oplus (0, \frac{1}{2})$ . Esta es la representación *espinorial*. A fin de ver esto, considere la llamada *representación quiral* de las matrices de Dirac, en las que el único cambio respecto a la representación standard es en  $\gamma_{quiral}^0 = \begin{bmatrix} 0 & 1_{2 \times 2} \\ 1_{2 \times 2} & 0 \end{bmatrix}$

(a) Muestre que una transformación de Lorentz preserva espinores de la forma  $\begin{bmatrix} \xi \\ 0 \end{bmatrix}$  y  $\begin{bmatrix} 0 \\ \chi \end{bmatrix}$ .

(b) Calcule los generadores  $A$  y  $B$  del Ejercicio 10 en esta representación y verifique que los dos tipos de espinores del inciso anterior corresponden a la representación  $(\frac{1}{2}, 0)$  y  $(0, \frac{1}{2})$ .

✓ Resuelto en la sección 2.3.1 de las notas de la práctica.

19 Probar que las soluciones de la ecuación de Dirac tienen la forma

$$\begin{aligned} \psi_p^+(x) &= u^s(p) e^{-ipx}, \text{ con } p^2 = m^2 \text{ y } p^0 > 0; \\ \psi_p^-(x) &= v^s(p) e^{+ipx}, \text{ con } p^2 = m^2 \text{ y } p^0 > 0, \end{aligned}$$

con

$$u^s(p) = \begin{bmatrix} \sqrt{p_\mu \sigma^\mu} \xi^s \\ \sqrt{p_\mu \bar{\sigma}^\mu} \xi^s \end{bmatrix}, \quad v^s(p) = \begin{bmatrix} \sqrt{p_\mu \sigma^\mu} \eta^s \\ -\sqrt{p_\mu \bar{\sigma}^\mu} \eta^s \end{bmatrix}, \quad (s = 1, 2),$$

donde  $(\sigma^\mu) = (1, \sigma^x, \sigma^y, \sigma^z)$ ,  $(\bar{\sigma}^\mu) = (1, -\sigma^x, -\sigma^y, -\sigma^z)$ .  $\xi^1$  y  $\xi^2$ , y  $\eta^1$  y  $\eta^2$  son bases ortonormales de espinores de dimensión 2.

20 Mostrar que

$$\sum_{s=1,2} u^s(p) \bar{u}^s(p) = (\not{p} + m), \quad \sum_{s=1,2} v^s(p) \bar{v}^s(p) = (\not{p} - m), \quad (1)$$

donde  $\not{p} \equiv \gamma^\mu p_\mu$  (en general, un cuadrivector tachado representa la contracción del mismo con las matrices  $\gamma$ ).

21 \* Conjugación de Carga

(a) Muestre que si  $\Psi$  es solución de la ecuación de Dirac, también lo es  $\Psi^c \equiv C\Psi^*$ , siendo  $C$  una matriz que cumple:

$$C^{-1}\gamma^\mu C = -(\gamma^\mu)^*$$

(b) Verifique que en la representación standard y quiral,  $C$  puede elegirse como  $i\gamma^2$ .

(c) Existe una representación en la que todas las matrices  $\gamma$  son imaginarias puras, conocida como *representación de Majorana*. Busque en la bibliografía la expresión de las matrices  $\gamma$  en esta representación y muestre que la operación de conjugación de carga se reduce a la conjugación ordinaria.

(d) Muestre que las soluciones de tipo  $u$  y  $v$  halladas anteriormente están relacionadas por la operación conjugación de carga.

✓ Pueden ver por ejemplo el Ejercicio 4.40 del libro de Radovanovic.